

اصلاحیه بوکلت مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ویژه پزشک و ماما (چاپ هشتم برای تبدیل شدن به تجدید نظر نهم)

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۹	خانه شماره ۱-	علائم خطر فوری	علائم نیازمند اقدام فوری
۹	خانه شماره ۳-	علائم خطر فوری	علائم نیازمند اقدام فوری
۹	بخش مراقبت های ویژه	در معرض خطر	نیازمند توجه ویژه
۱۰	الف- رنگ قرمز	شرایط خطرناکی	شرایطی
۱۰	اصول کلی		این مطلب پس از "در نظر گرفته شده است:" اضافه شود: در اولین مراجعه مادر، بارداری وی را تبریک بگویید و با تکریم و احترام به مادر هنگام ارائه مراقبت ها، بارداری را برای او خوشایند سازید.
۱۰	اصول کلی	علائم خطر	نیازمند توجه و مراقبت ویژه
۱۱	پیش از بارداری (الف)	گروه نیازمند مراقبت های پیش از بارداری در صورت تمایل به بارداری شامل: تا کسانی که برای مراقبت پس از زایمان مراجعه می کنند. (حذف شود)	این مطلب اضافه شود: تمامی خانم هایی که تمایل به بارداری دارند می توانند مراقبت پیش از بارداری را دریافت کنند مگر در مواردی که مطابق بسته خدمت مشاوره فرزندآوری، مشمول منع نسبی و مطلق بارداری می شوند.
۱۱	پیش از بارداری (الف) (دو مورد آخر)	*در موارد احتمال ناباروری، تا زمانی که فرد تمایل به باردار شدن دارد، می بایست مراقبت پیش از بارداری هر سال برای وی انجام شود. (حذف شود) * خانم پس از یک سال (و در سنین بالای ۳۵ سال پس از ۶ ماه) پیگیری شود و در صورت عدم بارداری، جهت بررسی مشکلات احتمالی باروری به مراکز ناباروری معرفی شود. (حذف شود)	
۱۲	زایمان و بلافاصله پس از زایمان (ت)	در معرض خطر	نیازمند مراقبت ویژه
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * پیش از بارداری	- غربالگری سلامت روان (حذف شود) - غربالگری اولیه همسرآزاری(حذف شود) - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر	-غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) *مراقبت ۱ هفته ۶ تا ۱۰	- غربالگری سلامت روان، شرح حال اولیه روانپزشکی(حذف شود) - غربالگری اولیه همسرآزاری(حذف شود) - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر	-غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) *مراقبت ۱ هفته ۶ تا ۱۰	- علائم خطر بارداری	-علائم نیازمند مراقبت ویژه
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * مراقبت ۲ هفته ۱۶ تا ۲۰	- شکایت های شایع و علائم خطر	-علائم نیازمند مراقبت ویژه بارداری

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * مراقبت ۲ هفته ۱۶ تا ۲۰	- غربالگری سلامت روان، غربالگری اولیه همسرآزاری(حذف شود) - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد محرک و مخدر	- غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * مراقبت ۳ هفته ۲۴ تا ۳۰	- شکایت های شایع و علائم خطر	-علائم نیازمند مراقبت ویژه بارداری
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * مراقبت ۵و۴ هفته ۳۱ تا ۳۴ هفته ۳۵ تا ۳۷	- شکایت های شایع و علائم خطر	-علائم نیازمند مراقبت ویژه بارداری
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * مراقبت ۵و۴ هفته ۳۱ تا ۳۴ هفته ۳۵ تا ۳۷	- غربالگری سلامت روان(حذف شود) - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد محرک و مخدر	-غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۳	جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * مراقبت ۶ تا ۸ هفته ۳۸ تا ۴۰ (هر هفته یک مراقبت)	- شکایت های شایع و علائم خطر	-علائم نیازمند مراقبت ویژه بارداری
۱۴	ادامه جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) * پیش از بارداری	- غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد محرک و مخدر - زمان مناسب بارداری(حذف شود)	-غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۴	ادامه جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) مراقبت ۲ هفته ۱۶ تا ۲۰	- علائم خطر	-علائم نیازمند مراقبت ویژه
۱۴	ادامه جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) مراقبت ۴ و ۵ هفته ۳۱ تا ۳۴ هفته ۳۵ تا ۳۷	- علائم خطر - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد محرک و مخدر - شیردهی - زمان مناسب بارداری بعدی(حذف شود) - علائم خطر نوزاد	-علائم نیازمند مراقبت ویژه - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد - اصول شیردهی - علائم نیازمند مراقبت ویژه نوزادی
۱۴	ادامه جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) مراقبت ۶ تا ۸ هفته ۳۸ تا ۴۰ (هر هفته یک مراقبت) (آموزش و مشاوره)	- علائم خطر - شیردهی - خطر نوزاد	-علائم نیازمند مراقبت ویژه - اصول شیردهی -علائم نیازمند مراقبت ویژه نوزادی
۱۴	ادامه جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع) مکمل های دارویی	اسید فولیک اسید فولیک	اسید فولیک همراه با ید اسید فولیک همراه با ید
۱۴	جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع) زمان مراقبت/نوع مراقبت	مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده	تشکیل پرونده و ارزیابی
۱۴	جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع) مراقبت ۲ روزهای ۱۰ تا ۱۵ (تشکیل پرونده و ارزیابی)	- غربالگری سلامت روان/ همسرآزاری	- ارزیابی الگوی تغذیه (اضافه شود) -غربالگری افسردگی پس از زایمان
۱۴	جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع) مراقبت ۲ روزهای ۱۰ تا ۱۵ (تشکیل پرونده و ارزیابی)	-علائم خطرو عوارض	-علائم نیازمند مراقبت ویژه و عوارض
۱۴	جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع)	- علائم خطر مادر و نوزاد	-علائم نیازمند توجه ویژه مادر و نوزاد

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
	مراقبت ۲ روزهای ۱۰ تا ۱۵ (آموزش و مشاوره)	- زمان مناسب باراری	
۱۴	جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع) مراقبت ۳ روزهای ۳۰ تا ۴۲ (تشکیل پرونده و ارزیابی)	- علائم خطر و عوارض - غربالگری سلامت روان/ همسرآزاری	-علائم نیازمند مراقبت ویژه و عوارض -غربالگری افسردگی پس از زایمان
۱۴	جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع) مراقبت ۳ روزهای ۳۰ تا ۴۲ (آموزش و مشاوره)	- علائم خطر مادر و نوزاد زمان مناسب بارداری بعدی(حذف شود)	-علائم نیازمند مراقبت ویژه مادر و نوزاد
۱۶	الف ۱- مراقبت پیش از بارداری اقدام	- تجویز اسید فولیک - غربالگری اولیه همسرآزاری ح ۱۴(حذف شود) -غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر	-تجویز اسید فولیک همراه با ید -غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۷	آموزش و توصیه	دخانیات زمان مناسب باردار شدن	مضرات دخانیات زمان مناسب بارداری بعدی
۱۷	ایمن سازی واکسن سرخچه	روش موثر پیشگیری از بارداری استفاده کند	روش موثر پیشگیری از بارداری با نظر پزشک استفاده کند
۱۷	تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال	زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال(حذف شود)	
۱۷	تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال	محرک و مخدر (حذف شود)	
۱۷	تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال	همسرآزاری (حذف شود)	
۱۸	رفتار پرخطر - قبل از "شغل"		- زمان مناسب بارداری بعدی: به مادر توصیه کنید بهتر است بعد از دوره شیردهی، برای بارداری بعدی اقدام کند ولی در صورت وقوع بارداری قبل از آن، منعی وجود ندارد و نگرانی مادر در این مورد را برطرف کنید.(اضافه شود)
۱۸	غربالگری اولیه مصرف دخانیات	غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر	غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۸	غربالگری سلامت روان	کل پاراگراف حذف شود	
۱۸	غربالگری همسرآزاری	کل پاراگراف حذف شود	
۱۸	همسر آزاری	کل پاراگراف حذف شود	
۱۸	خشونت جسمی	کل پاراگراف حذف شود	
۱۹	خشونت جنسی	کامل حذف شود	
۱۹	خشونت روانی	کل پاراگراف حذف شود	
۱۹	فاصله مناسب دو بارداری	کل پاراگراف حذف شود	
۱۹	مشاوره ژنتیک	کامل حذف شود	
۱۹	مکمل های دارویی	یدوفولیک (حذف شود)	یا اسید فولیک همراه با ۱۵۰ میکروگرم ید

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۲۰	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۱ اختلال ژنتیکی	اختلال ژنتیکی	مشکلات ژنتیکی
۲۰	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری ردیف ۲ اختلالات روانپزشکی	همسرآزاری با توجه به تعاریف (حذف شود) احتمال عود یا تشدید بیماری، تکرار همسرآزاری در مورد همسر آزاری، ارجاع غیرفوری (کامل حذف شود)	احتمال عود
۲۰	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۳ بارداری پنجم و بالاتر	کل ردیف حذف شود	
۲۰	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۵ سزارین تکراری	کل ردیف حذف شود	
۲۰	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۶ سن زیر ۱۸ سال	کل ردیف حذف شود	
۲۰	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۷ سن بالای ۳۵ سال	کل ردیف حذف شود	
۲۱	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (ادامه) (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۱۳ فاصله نامناسب بارداری تا زایمان قبلی	کل ردیف حذف شود	
۲۱	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (ادامه) (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۱۴ مصرف فعال مواد مخدر	مصرف فعال مواد مخدر و محرک	مصرف فعال مواد
۲۱	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (ادامه) (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۱۶ مصرف مواد مخدر افیونی	مخدر افیونی (حذف شود)	
۲۱	جدول الف ۲ - راهنمای مراقبت پیش از بارداری (ادامه) (وضعیت فعلی و سوابق) ردیف ۱۷ مصرف مواد محرک مت آمفتامینی	مصرف مواد محرک مت آمفتامینی	مصرف مواد مت آمفتامینی
۲۳	جدول الف ۳- بیماری ها و ناهنجاری ها (ادامه)-توصیه و اقدام- ردیف ۱۵	ارزیابی خطر ترومبوآمبولی	ارزیابی احتمال بروز ترومبوآمبولی
۲۸	ب ۲ - مراقبت های نیمه اول (۲۰ هفته اول) بارداری	ارزیابی علائم خطر فوری	ارزیابی علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۲۸	ب ۲ - مراقبت های نیمه اول (۲۰ هفته اول) بارداری	در صورت نبود علائم خطر فوری	در صورت نبود علائم فوق
۲۸	ب ۲ - مراقبت های نیمه اول (۲۰ هفته اول) بارداری - ارزیابی	شکایت شایع (حذف شود)	
۲۸	ب ۲ - مراقبت های نیمه اول (۲۰ هفته اول) بارداری - اقدام	- غربالگری سلامت روان ح ۱۵ (حذف شود) - غربالگری اولیه همسر آزاری ح ۱۴ (حذف شود) - غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و محرک	غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد
۲۹	ب ۳- مراقبت های نیمه دوم (۲۰ هفته دوم) بارداری	ارزیابی علائم خطر فوری	ارزیابی بالینی نیازمند اقدام فوری
۲۹	ب ۳- مراقبت های نیمه دوم (۲۰ هفته دوم) بارداری- اقدام	- غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و محرک	غربالگری اولیه مصرف دخانیات، الکل و مواد

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
		<p>– غربالگری سلامت روان ح ۱۵ (حذف شود)</p> <p>– غربالگری اولیه همسر آزاری ح ۱۴ (حذف شود)</p>	
۳۰	ارزیابی الگوی تغذیه (آخر جمله)		در صورت امتیاز نامطلوب، مادر نیاز به ارجاع و پیگیری دارد. (اضافه شود)
۳۰	ارزیابی علائم	ارزیابی علائم خطر فوری	ارزیابی علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۳۱	برقراری ارتباط مناسب با مادر:	صلح جویانه (حذف شود)	
۳۲	تشکیل پرونده و شرح حال: تاریخچه اجتماعی؛	<p>سن زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال (حذف شود)</p> <p>مصرف مواد مخدر و محرک</p> <p>همسرآزاری (حذف شود)</p> <p>بارداری پنجم و بالاتر (حذف شود)</p>	مصرف مواد
۳۴	علائم خطر بارداری	علائم خطر بارداری	علائم نیازمند مراقبت ویژه در بارداری
۳۵	غربالگری تغذیه و ارزیابی الگوی تغذیه	غربالگری تغذیه و ارزیابی الگوی تغذیه تا آخر پاراگراف حذف شود	
۳۵	غربالگری سلامت روان	غربالگری سلامت روان تا آخر پاراگراف حذف شود	
۳۵	غربالگری ناهنجاری جنین	غربالگری ناهنجاری جنین تا آخر پاراگراف حذف شود	
۳۵	غربالگری همسرآزاری	<p>از غربالگری همسرآزاری، همسرآزاری، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی تا پایان پاراگراف، کلیه مطالب حذف شود</p>	
۳۶	● مراقبت های نیمه اول و دوم بارداری	علائم خطر فوری	علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۳۶	مکمل های دارویی	<p>یدو فولیک</p> <p>یدو فولیک تجویز شود</p>	<p>اسیدفولیک همراه با ید</p> <p>اسید فولیک همراه با ۱۵۰ میکروگرم ید تجویز شود.</p>
۳۷	نازایی	نازایی:عدم وقوع بارداری پس از تا آخر حذف شود	
۳۸	پ- مراقبت های ویژه بارداری (پ۱-)	علائم خطر فوری	علائم نیازمند اقدام فوری
۳۸	پ- مراقبت های ویژه بارداری (پ۲۱-)	سایر موارد خطر در بارداری فعلی	سایر موارد نیازمند توجه ویژه
۳۹	پ۱- علائم خطر فوری	علائم خطر فوری	علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۴۰	جدول پ۲- فشار خون بالا (علائم همراه- نیمه دوم)	سایر علائم خطر	سایر علائم پره اکلامپسی
۴۰	جدول پ۲- فشار خون بالا (اقدام- نیمه دوم)	آموزش علائم خطر	آموزش علائم پره اکلامپسی
۴۳	جدول پ۴- درد/درد شکم (اقدام زرد رنگ)	آموزش علائم خطر و پیگیری ۱ هفته بعد	آموزش علائمی مانند تب، کاهش حرکت جنین و ... و پیگیری ۱ هفته بعد
۴۵	جدول پ۴- درد/درد یک طرفه ساق و ران(علائم همراه)	با یا بدون ورم	ورم یک طرفه اندام
۴۷	جدول پ۶- تب (اقدام خانه اول)	اعزام	اعزام طبق ح ۱
۴۷	جدول پ۶- تب (اقدام خانه دوم)	اعزام	اعزام طبق ح ۱

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
			باز کردن رگ و تزریق سرم نرمال سالین یا رینگر به میزان یک لیتر در ۲-۳ ساعت (به اقدامات حین اعزام اضافه شود)
۴۸	جدول پ۷- تنگی نفس/تپش قلب/سرفه (علائم همراه)	ادرار مکرر شبانه	ارتوپنه (مشکل تنفس در حالت دراز کشیده)
۴۹	جدول پ۷- تنگی نفس/تپش قلب/سرفه (پزشک مرکز) (اقدام خانم سوم زرد رنگ)	آموزش علائم خطر (حذف شود)	و تاکید به مراجعه در صورت اضافه شدن سایر علائم به آن (اضافه شود)
۵۰	پ۸- مشکلات ادراری-تناسلی (علائم همراه)	با یا بدون سوزش ادرار	سوزش ادرار
۵۲	جدول پ۱۰- اختلالات صدای قلب و حرکت جنین (اقدام) - انجام NST		- در صورت نبود NST ارجاع در اولین فرصت به بیمارستان اضافه شود
۵۶	جدول پ۱۴- وزن گیری نامطلوب (ارزیابی) تعیین کنید	توجه به	توجه به نمایه توده بدنی
۶۱	جدول پ۱۹- تفسیر نتایج آزمایش و سونوگرافی در بارداری (اقدام خانه چهارم و پنجم)	ارجاع به متخصص زنان یا داخلی ارجاع غیر فوری به متخصص زنان یا داخلی- غدد	ارجاع به متخصص زنان یا داخلی و ادامه مراقبت طبق پ ۱۸ ارجاع غیر فوری به متخصص زنان یا داخلی- غدد
۶۴	جدول پ۲۰- بیماری ها و ناهنجاری ها (اقدام خانه دوم)	- ارجاع جهت ختم بارداری در هفته ۳۸ به روش سزارین	ارجاع در هفته ۳۶ بارداری جهت بررسی بار ویروسی (اضافه شود) ارجاع جهت ختم بارداری در هفته ۳۸ : در صورت بار ویروسی کمتر از ۱۰۰۰ copies/ml انجام زایمان به روش طبیعی در غیر این صورت به روش سزارین
۶۷	جدول پ۲۰- بیماری ها و ناهنجاری ها (ادامه) (اقدام ردیف ۲۱)		بررسی احتمال بروز ترومبوآمبولی طبق راهنمای ح ۱۲ (از ارجاع جدا شود)
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی	موارد خطر	موارد نیازمند توجه ویژه
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی -عنوان ردیف اول	اختلال ژنتیکی	مشکلات ژنتیکی
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی-اقدام ردیف اول		مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (بارداری همزمان با IUD)- اقدام ردیف دوم		مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی -عنوان ردیف ۳	بارداری پنجم و بالاتر	نکات مرتبط با تعداد بارداری
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی -نکات مرتبط با تعداد بارداری- اقدام ردیف سوم		تبریک به مادر برای بارداری و عدم القای ترس از بارداری (اضافه شود) مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی-بارداری زیر ۱۸ سال (ردیف ۴)	بارداری زیر ۱۸ سال (ردیف کامل حذف شود)	
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی- عنوان ردیف ۵	بارداری بالای ۳۵ سال	نکات مرتبط با سن مادر
۶۸	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی-نکات مرتبط با سن مادر- اقدام ردیف ۵	- در صورت بارداری اول یا نمایه توده بدنی بیش از ۳۰ تا روزانه از هفته ۱۲ تا ۳۶ بارداری (حذف شود)	در صورت سن بالای ۳۵ سال:

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
		ارزیابی خطر ترومبوآمبولی غربالگری کاردیومیوپاتی در ملاقات	همراه با یکی از موارد بارداری اول با نمایه توده بدنی بیش از ۳۰ یا سابقه زایمان نوزاد کم وزن یا مرده زایی: تجویز آسپرین به میزان ۸۰ میلی گرم روزانه از هفته ۳۶-۱۲ بارداری (اضافه شود) ارزیابی احتمالی بروز ترومبوآمبولی غربالگری کاردیومیوپاتی (در سن بالای ۳۰) در ملاقات مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (ادامه)	موارد خطر	موارد نیازمند توجه ویژه
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی - بارداری با قرص پروژسترونی- اقدام		مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی - بارداری با TL- اقدام		مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی - بارداری همزمان با شیردهی- اقدام		مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی - حاملگی برنامه ریزی نشده (ردیف ۱۰)	حاملگی برنامه ریزی نشده(ردیف کامل حذف شود)	
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (ادامه) - رفتار پر خطر(ردیف ۱۱)	رفتار پرخطر	در مادر یا همسر(به عنوان اضافه شود)
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (ادامه) - رفتار پر خطر(ردیف ۱۱)- اقدام		- انجام نوبت دوم آزمایش HIV در هفته ۳۴-۳۱ بارداری(اضافه شود) مشاوره انصراف از سقط و بیان ممنوعیت سقط عمدی حتی زیر ۴ ماهگی (منع شرعی)(اضافه شود)
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی - غربالگری مثبت سلامت روان(ردیف ۱۴)	غربالگری مثبت سلامت روان (ردیف کامل حذف شود)	
۶۹	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی - یک ردیف اضافه گردد		عنوان: سن بارداری نامشخص تاثیر بر بارداری: نامشخص بودن زمان زایمان اقدام : - گرفتن شرح حال دقیق - درخواست سونوگراف یربای تعیین سن بارداری در اولین مراجعه (اضافه گردد)
۷۰	جدول پ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (ادامه)	موارد خطر	موارد نیازمند توجه ویژه

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۷۰	جدول پ ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (ادامه)- همسر آزاری(ردیف ۲۰)	همسر آزاری(ردیف کامل حذف شود)	
۷۰	جدول پ ۲۱- سایر موارد خطر در بارداری فعلی (ادامه)- نمایه توده بدنی غیر طبیعی(ردیف ۱۹)- اقدام	ارزیابی خطر	احتمال بروز
۷۳	گروه بندی علائم و نشانه ها	مصرف مواد مخدر و محرک	مصرف مواد
۷۳	گروه بندی علائم و نشانه ها	شکم اول	بارداری اول
۷۳	گروه بندی علائم و نشانه ها	زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال (حذف شود)	
۷۷	ارزیابی اولیه -ارزیابی علائم خطر فوری	علائم خطر فوری	علائم بالینی نیازمند اقدام
۷۷	ارزیابی اولیه -ارزیابی علائم خطر فوری	علائم خطر فوری (حذف شود)	
۷۷	ارزیابی اولیه - برقراری ارتباط موثر با مادر	ارتباط موثر بین ارائه دهنده خدمت(حذف شود)	
۷۷	ارزیابی اولیه - برقراری ارتباط موثر با مادر	و	با
۷۷	ارزیابی اولیه - برقراری ارتباط موثر با مادر	قابل قبول فرهنگی	قابل قبول فرهنگی ارتباط برقرار کنید ترس و نگرانی از زایمان را در او کاهش دهید و سعی کنید روند زایمان برای وی خوشایند شود.(اضافه شود)
۷۷	ارزیابی اولیه- تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال: - تاریخچه اجتماعی	سن زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال	سن مادر
۷۷	ارزیابی اولیه- تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال: - تاریخچه اجتماعی	بارداری پنجم و بالاتر	تعداد بارداری
۷۷	ارزیابی اولیه- تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال: - تاریخچه اجتماعی	مصرف مواد مخدر و محرک	مصرف مواد
۷۸	بعد از پاراگراف زایمان سریع		زایمان قریب الوقوع: زایمانی که با توجه به فاصله تا محل ارجاع، اندازه جنین، وضعیت جنین، وضعیت ابعاد لگن مادر و انقباضات رحمی، در مدت زمانی کمتر از یک ساعت انجام شود. نکته: انجام زایمان مادر نیازمند مراقبت ویژه (مطابق بخش مراقبت ویژه زایمان)در واحدهای تسهیلات زایمانی جایز نیست مگر در موارد زایمان قریب الوقوع که در این صورت حتماً باید از یک پزشک یا مامای دیگر کمک گرفته شود. (اضافه شود)
۷۸	غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار	سیگار،الکل و مواد مخدر و محرک:	دخانیات، الکل و مواد
۷۹	نازایی	نازایی: عدم وقوع بارداری پس از یک سال نزدیکی بدون استفاده از روش های پیشگیری از بارداری (کامل حذف شود)	
۸۲	بررسی وضعیت رحم و میزان خونریزی - نکته ۲	علامت خطر است.	نیاز به توجه ویژه دارد.

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۸۳	۶ ساعت اول پس از زایمان – آموزش و توصیه	علائم خطر مادر و نوزاد	علائم نیازمند مراقبت ویژه
۸۳	بررسی وضعیت رحم و میزان خونریزی- نکته ۱	علامت خطر است.	نیاز به توجه ویژه دارد.
۸۴	ث- مراقبت های ویژه زایمان (۶ ساعت اول پس از زایمان) (ث ۱-)	علائم خطر فوری	علائم نیازمند اقدام فوری
۸۴	ث- مراقبت های ویژه زایمان (۶ ساعت اول پس از زایمان) (ث ۱۰-)	سایر موارد خطر حین زایمان	سایر موارد نیازمند مراقبت ویژه
۸۴	ث- مراقبت های ویژه زایمان (۶ ساعت اول پس از زایمان) (ث ۱۱-)	سایر موارد خطر بلافاصله پس از زایمان	سایر موارد نیازمند مراقبت ویژه
۹۴	جدول ث ۱۰- سایر موارد خطر حین زایمان	موارد خطر حین زایمان	موارد نیازمند مراقبت ویژه حین زایمان
۹۴	جدول ث ۱۰- سایر موارد خطر حین زایمان (عنوان ردیف ۳)	مصرف مواد مخدر و محرک	مصرف مواد
۹۵	جدول ث ۱۰- سایر موارد خطر حین زایمان (ادامه) (عنوان ۱۱)	شکم اول زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال	بارداری اول
۹۵	جدول ث ۱۰- سایر موارد خطر حین زایمان (ادامه)-ردیف ۱۱- بارداری اول- اقدام		در صورت بروز مواردی مانند آتونی، چسبندگی جفت، دیستوشی زایمان اقدام طبق هر مورد (اضافه شود)
۹۶	جدول ث ۱۱- سایر موارد خطر بلافاصله پس از زایمان	موارد خطر	موارد نیازمند مراقبت ویژه
۹۶	جدول ث ۱۱- سایر موارد خطر بلافاصله پس از زایمان-ردیف ۶- همتوم- اقدام	علائم خطر بزرگ شدن همتوم	علائم بزرگ شدن همتوم
۹۸	ث ۱۲- بیماری ها (ادامه) (اقدام در صورت قریب الوقوع بودن زایمان)-ردیف ۹- هیپر تیروئیدی- اقدام	توجه به خطر بروز طوفان تیروئیدی	توجه به بروز طوفان تیروئیدی
۹۹	ث ۱۳- سوابق زایمان قبلی – ردیف ۸ نازایی	کل ردیف " نازایی" (نوع سابقه -اقدام -اقدام در....)حذف شود.	
۱۰۱	ج ۱- مراقبت های اول و دوم پس از زایمان	ارزیابی علائم خطر فوری	ارزیابی علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۱۰۱	ج ۱- مراقبت های اول و دوم پس از زایمان – زیر باکس قرمز	علائم خطر فوری	علائم فوق
۱۰۱	ج ۱- مراقبت های اول و دوم پس از زایمان -ارزیابی	شکایت شایع (حذف شود)	
۱۰۱	ج ۱- مراقبت های اول و دوم پس از زایمان-اقدام- باکس سبز	غربالگری سلامت روان ح ۱۶ (حذف شود)	ارزیابی الگوی تغذیه ح ۱۳ در مراقبت دوم (اضافه شود)
۱۰۱	ج ۱- مراقبت های اول و دوم پس از زایمان (اقدام)	غربالگری اولیه همسر آزاری ح ۱۴ در ملاقات دوم (حذف شود)	غربالگری افسردگی پس از زایمان ح ۱۶ (اضافه شود)
۱۰۲	ج ۲- مراقبت سوم پس از زایمان (ارزیابی خطر فوری)	علائم خطر فوری	علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۱۰۲	ج ۲- مراقبت سوم پس از زایمان – زیر باکس قرمز	علائم خطر فوری	علائم فوق
۱۰۲	ج ۲- مراقبت سوم پس از زایمان -ارزیابی	شکایت شایع (حذف شود)	
۱۰۲	ج ۲- مراقبت سوم پس از زایمان -اقدام- باکس سبز	غربالگری سلامت روان ح ۱۶ (حذف شود)	
۱۰۲	ج ۲- مراقبت سوم پس از زایمان (اقدام)	غربالگری اولیه همسر آزاری ح ۱۴ (حذف شود)	غربالگری افسردگی پس از زایمان ح ۱۶(اضافه شود)
۱۰۳	ارزیابی علائم خطر فوری	علائم خطر فوری	علائم بالینی نیازمند اقدام فوری
۱۰۳	ارزیابی علائم خطر فوری	علائم خطر فوری	تشنج، اختلال هوشیاریف شوک، تنفس مشکل

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۱۰۳	تشکیل پرونده و شرح حال	مصرف الکل، مواد مخدر و محرک	مصرف الکل و مواد
۱۰۳	درد شکم و یا پهلوها		زمان مناسب بارداری بعدی: به مادر توصیه کنید بهتر است بعد از دوره شیردهی، برای بارداری بعدی اقدام کند ولی در صورت وقوع بارداری قبل از آن، منعی وجود ندارد و نگرانی مادر در این مورد را برطرف کنید. (اضافه شود)
۱۰۴	علائم حیاتی	به مدت ۳-۱ دقیقه	به مدت ۱ دقیقه
۱۰۴	علائم خطر پس از زایمان	علائم خطر	علائم نیازمند مراقبت ویژه
۱۰۴	غربالگری سلامت روان	غربالگری سلامت روان	افسردگی پس از زایمان
۱۰۴	غربالگری همسرآزاری	کل پاراگراف مربوط به غربالگری همسرآزاری حذف شود.	
۱۰۴- ۱۰۵	مشاوره زمان مناسب بارداری بعدی	کل پاراگراف مربوط به مشاوره زمان مناسب بارداری بعدی حذف شود.	
۱۰۶	چ- مراقبت های ویژه پس از زایمان (عنوان) چ-۱	علائم خطر	علائم نیازمند اقدام
۱۰۶	چ- مراقبت های ویژه پس از زایمان (عنوان) چ-۹	سایر موارد خطر	سایر موارد نیازمند مراقبت ویژه
۱۰۷	چ-۱- علائم خطر فوری	علائم خطر فوری	علائم نیازمند اقدام فوری
۱۰۸	چ-۲- فشار خون بالا (علائم و تشخیص احتمالی)- ردیف ۲		فشار خون سیتول بیشتر از ۱۴۰ و کمتر از ۱۶۰ میلی متر جیوه (به ابتدای جمله اضافه شود) یا فشار خون دیاستول بیشتر آموزش علائم
۱۰۹	چ-۳- خونریزی/لکه بینی - باکس سبز رنگ- اقدام	آموزش علائم خطر	آموزش علائم
۱۱۰	چ-۴- تب- باکس ارزیابی - قسمت "سوال کنید"	تهوع، استفراغ، لرز (حذف شود)	
۱۱۰	چ-۴- تب- باکس ارزیابی - قسمت "سوال کنید"	بیماری دیابت، مصرف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی(حذف شود)	
۱۱۰	چ-۴- تب- باکس ارزیابی - قسمت " تعیین کنید"	نمایه توده بدنی (حذف شود)	
۱۱۱	چ-۵- درد/ سردرد-باکس ارزیابی- قسمت "سوال کنید"	سابقه سینوزیت مزمن (حذف شود)	
۱۱۱	چ-۵- درد/ سردرد - علائم همراه- ردیف اول	سردرد با یا بدون فشار خون بالا	سردرد همراه فشار خون بالا
۱۱۱	چ-۵- درد/ سردرد - علائم همراه- ردیف اول	اختلال بینایی، استفراغ	سردرد همراه با اختلال بینایی یا استفراغ
۱۱۱	چ-۵- درد/ سردرد -علائم همراه- تشخیص احتمالی- ردیف دوم		بعد از عوارض بیهوشی، "خستگی پس از زایمان" (اضافه شود)
۱۱۲	چ-۵- درد/درد پستان - باکس ارزیابی- تعیین کنید	علائم حیاتی	درجه حرارت
۱۱۲	چ-۵- درد/ساق و ران	ساق و ران	درد یک طرفه ساق و ران

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۱۱۳	چ۶- مشکلات ادراری (پایین جدول)	* این موارد در معرض شوک هستند با بروز علائم شوک، درمان شوک انجام شود. (حذف شود)	
۱۱۴	چ۷- سرگیجه/رنگ پریدگی- رنگ پریدگی و علائم حیاتی طبیعی- باکس اقدام		باکس اقدام پزشک به صورت کامل از پایین صفحه به باکس آنمی و زیر هموگلوبین ۷-۱۰ گرم در دسی لیتر و بعد از ارجاع در اولین فرصت به پزشک مرکز " جابجا گردد.
۱۱۴	جدول اقدام پزشک		کل ردیف هموگلوبین ۷-۱۰ گرم در دسی لیتر(علائم همراه، تشخیص احتمالی) (حذف شود) و باکس اقدام به صورت کامل به باکس زرد بالا مطابق توضیح ردیف بالا تحت عنوان " اقدام پزشک" اضافه گردد
۱۱۶	چ۹- سایر موارد خطر	موارد خطر	موارد نیازمند مراقبت ویژه
۱۱۶	چ۹- سایر موارد خطر - ردیف ۶- سن زیر ۱۸ سال	کل ردیف سن زیر ۱۸ سال (حذف شود)	
۱۱۶	چ۹- سایر موارد خطر - ردیف ۹ - عنوان	مصرف مواد مخدر و محرک	مصرف مواد
۱۱۶	چ۹- سایر موارد خطر - ردیف ۱۰- همسر آزاری	کل ردیف همسر آزاری (حذف شود)	
۱۱۷	جدول ح- راهنما (عنوان) ح۹	مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و محرک در شیردهی	مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۱۷	جدول ح- راهنما (عنوان) ح۱۲	ارزیابی خطر ترومبوآمبولی	ارزیابی احتمال بروز ترومبوآمبولی
۱۱۷	جدول ح- راهنما (عنوان) ح۱۴	غربالگری همسرآزاری (حذف شود)	
۱۱۷	جدول ح- راهنما (عنوان) ح۱۵	(پیش از بارداری و بارداری)	پس از زایمان
۱۱۷	جدول ح- راهنما (عنوان) ح۱۶	غربالگری سلامت روان (پس از زایمان)	پارتوگراف
۱۱۸	ح۲- بررسی منشا خونریزی * مراقبت پس از سقط پس از ترخیص از بیمارستان - در صورت عدم تمایل به	مشاوره باروری سالم	مشاوره با پزشک
۱۱۸	ح۲- بررسی منشا خونریزی * مراقبت پس از سقط - آموزش علائم خطر	آموزش علائم خطر	آموزش علائم
۱۱۸	ح۲- بررسی منشا خونریزی * مراقبت پس از سقط پس از دفع نسج - در صورت عدم تمایل به	مشاوره باروری سالم	مشاوره با پزشک
۱۱۸	ح۲- بررسی منشا خونریزی * مراقبت پس از سقط پس از دفع نسج - آموزش علائم خطر	آموزش علائم خطر	آموزش علائم
۱۱۸	ح۲- بررسی منشا خونریزی * مراقبت پس از سقط پس از دفع نسج - نکته:	در مادر آموزش دهید که برای یک بار سقط بررسی خاصی نیاز نیست و بارداری بعدی در هر زمان منعی ندارد.	به مادر آموزش دهید که برای یک بار سقط بررسی خاصی نیاز نیست و هر زمانی که از نظر روحی آمادگی دارد می تواند باردار شود.
۱۲۲	ح۹- مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و محرک	مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و محرک در شیردهی	مصرف دخانیات، الکل و مواد
۱۲۲	ح۱۰- داروهای روانپزشکی در بارداری- کلیات- * در بارداری برنامه ریزی شده، لازم است	* در بارداری برنامه ریزی شده، لازم است مادر در مورد قطع یا	* لازم است مادر در مورد قطع یا

صفحه	آدرس	عناوین نیازمند اصلاح و یا حذف	عناوین اصلاح شده و یا اضافه شده
۱۲۴	ح ۱۱- غربلگری کاردیومیوپاتی در بارداری (امتیازدهی و اقدام)	۳ تا ۴ = خطر متوسط . اقدام: ارجاع در اولین فرصت	۳ تا ۴ = خطر متوسط ارجاع در اولین فرصت به متخصص قلب
۱۲۴	ح ۱۱- غربلگری کاردیومیوپاتی در بارداری (امتیازدهی و اقدام)	۵ و بیشتر = خطر شدید . اقدام : ارجاع فوری	۵ و بیشتر = خطر شدید . اقدام : ارجاع فوری به بیمارستان
۱۲۵	ح ۱۲- ارزیابی خطر ترومبوآمبولی	ارزیابی خطر ترومبوآمبولی	احتمال بروز
۱۲۷	جدول ح ۱۴- غربالگری همسر آزاری	کل جدول حذف شود.	
۱۲۷	جدول ح ۱۵- غربالگری سلامت روان (پیش از بارداری، بارداری)	کل جدول حذف شود.	
۱۲۸	ح ۱۶- غربالگری سلامت روان (پس از زایمان)	غربالگری سلامت روان(پس از زایمان)	غربالگری افسردگی پس از زایمان
۱۲۹	پابین جدول – مادرانی که نتیجه آزمون	مادرانی که نتیجه آزمون تا آخر پاراگراف (حذف شود)	امتیاز ۸ و کمتر: غربال منفی امتیاز ۹ تا ۱۱: (بدون افکار آسیب به خود): انجام غربالگری مجدد یک ماه بعد امتیاز ۱۲ تا ۱۳: ارجاع غیر فوری به پزشک جهت ارزیابی تکمیلی امتیاز ۱۴ و بالاتر: ارجاع فوری به پزشک (اضافه شود)