



نکاتی در خصوص واکسیناسیون کرونا در بارداری – ویژه ناظرین طرح شهدای سلامت

از شروع پاندمی کووید-۱۹ میلیون ها نفر در سراسر جهان جان خود را در اثر این بیماری از دست داده‌اند. در این میان تحقیقات بر روی زنان باردار نشان داده که اگر چه مادران باردار در خطر بالاتر ابتلا به بیماری نیستند، اما در صورت ابتلا تا حد بیشتری در معرض خطر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و بروز علایم شدیدتر بیماری هستند. کووید در مادران باردار می‌تواند باعث ایجاد زایمان زودرس، مرده‌زایی، دیسترس جنین، پارگی زودرس کیسه آب، افزایش میزان سزارین و مرگ آن‌ها گردد.

با توجه به تایید تجویز واکسن سینوفارم در بارداری توسط وزارت بهداشت، تزریق واکسن سینوفارم در مادران باردار با شرایط اعلام شده زیر قابل انجام است:

- ✓ واکسیناسیون مادر باردار واجد شرایط، منوط به رضایت شفاهی وی پس از مشاوره خواهد بود.
- ✓ گروه هدف واکسیناسیون کووید مادران باردار شامل مادران باردار ۱۸ سال و بالاتر می باشد.
- ✓ مادران باردار می توانند واکسن را بعد از پایان هفته ۱۲ بارداری تا یک هفته قبل از ختم بارداری دریافت نمایند. بنابراین واکسیناسیون مادران باردار در هفته ۳۹ و بیشتر انجام نمی شود.
- ✓ پس از زایمان یا سقط، واکسیناسیون از روز دهم بعد از زایمان یا سقط قابل انجام است.
- ✓ در صورتی که مادر بارداری دز دوم واکسن را به دلیل نزدیک بودن به زمان زایمان دریافت نکرد، تزریق واکسن به روز ۱۵-۱۰ روز بعد از زایمان موکول می گردد.
- ✓ آموزش به مادران واکسینه شده، در خصوص رعایت پروتکل های پیشگیری بعد از تزریق واکسن کووید الزامی است.

نحوه مراجعه مادر باردار / زایمان کرده به واحد واکسیناسیون مستقر در واحد بهداشتی:

- مادر بایستی ابتدا به ماما / ماما مراقب (در مناطق شهری)، بهورز (در مناطق روستایی) مراجعه کند، تا ثبت بارداری یا زایمان مادر در سامانه سیب بررسی و **علایم خطر** دوران بارداری و پس از زایمان، همچنین **علایم احتمالی** ابتلا به کووید بررسی شود.

- در صورتی که مادر تحت پوشش واحد بهداشتی است، پس از بررسی موارد فوق **فرم معرفی نامه واحد بهداشتی برای انجام واکسیناسیون** در اختیار مادر قرار داده شده و **به واحد واکسیناسیون** ارجاع می گردد. برای مادران تحت مراقبت بخش خصوصی که جهت انجام واکسیناسیون مراجعه نموده اند، مدارک بارداری / زایمان مادر به همراه **فرم معرفی نامه مادر باردار بخش خصوصی جهت دریافت واکسن سینوفارم** بررسی شده و پس از تشکیل پرونده بارداری و دریافت حداقل یک مراقبت، به واحد واکسیناسیون ارجاع می گردد.
- ✓ در واحد واکسیناسیون پس از انجام واکسیناسیون:
- ✓ -عوارض احتمالی واکسن و اقدام لازم در صورت بروز آن به مادر آموزش داده می شود.
- ✓ -**کد ۴ در سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰** جهت مشاوره در خصوص عوارض احتمالی واکسن به مادر معرفی می شود.
- ✓ -زمان تزریق دوز دوم واکسن به مادر یادآوری می گردد.

چند نکته

- ✓ در مادران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی تزریق واکسن به صورت عمیق در عضله دلتوئید انجام می شود.
- ✓ فاصله بین واکسن و ویروس کرونا با واکسن توام در بارداری (حتی الامکان ۱۴ روز) می باشد.
- ✓ **واکسیناسیون مادران باردار / زایمان کرده (تا ۴۲ روز)، صرفاً در مراکز واکسیناسیون ویژه مادران باردار یا مراکز تعیین شده در طرح شهادی سلامت، انجام شده و از تزریق واکسن کووید به مادران در مراکز تجمیعی واکسیناسیون و یا بدون ارایه "فرم معرفی نامه ی مادر باردار جهت تزریق واکسن سینوفارم" خودداری گردد.**



واحد سلامت مادران

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آذر ماه ۱۴۰۰

