

عملکرد نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

سال ۱۳۹۹

دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

اداره سلامت مادران

گزارش توصیفی اطلاعات استخراج شده از مرگ مادر در سال ۹۹

جدول شماره ۱: تعداد موارد مرگ مادر:

تعداد کل موارد مرگ مادر ثبت شده سال ۹۹	تعداد مرگ مادر مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت با کوید	تعداد مرگ مادر مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت بدون کوید	تعداد موارد محسوب نشده
۵۷۶	۴۵۹	۲۷۴	۱۱۸

جدول شماره ۲: تعداد موارد محسوب نشده به تفکیک علت:

تصادف و حوادث*	قتل	غیر ایرانی بدون کارت اقامت	عدم تطابق با تعریف مرگ مادر*
۴۶	۱۰	۳۶	۲۶

* حوادث مانند: (سوختگی، غرق شدگی، گاز گرفتگی، تروما و.....)

*عدم تطابق با تعریف مرگ مادر مانند: (مرگهای پس از ۴۲ روز، انواع کانسرها و.....)

❖ تعداد موارد مرگ مادر به علت کوید = ۱۸۵ مورد که ۴۰,۴٪ از مرگهای سال ۹۹ را شامل می شود

❖ بنابراین تعداد موارد بدون احتساب کوید = ۲۷۳ مورد بوده است


نسبت مرگ مادر یا MMR:

- MMR یا نسبت مرگ مادران در کشور با توجه به تعداد موالید زنده ثبت شده در سازمان ثبت احوال در سال ۹۹ به تعداد (۱۱۳۱۴۸۶)، و با ۴۵۹ مورد مرگ مادر که مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد رقم ۴۰,۵ در صد هزار تولد زنده محاسبه می شود.


- با احتساب ۱۸۵ مورد مبتلا به کوید -۱۹ و جدا کردن آنها از آمار نسبت مرگ مادران بدون کوید- ۱۹

$$MMR = ۲۴,۲$$

نسبت مرگ مادران در کشور بر اساس نظام مراقبت مرگ مادر از سال ۹۹-۸۹ (با در نظر گرفتن موارد کوید)




نسبت مرگ مادران در کشور بر اساس نظام مراقبت مرگ مادر از سال ۹۹-۸۹ (بدون در نظر گرفتن موارد کوید)




❖ لازم به ذکر است در سال ۹۸ موارد آنفلوآنزا با موارد کوید اضافه شده بود که در نمودار بالا هر دو علت حذف شده اند.


میزان موالید از سال ۸۹-۹۹




درصد موارد مرگ ثبت شده مادران با احتساب موارد کوید ۱۹ به تفکیک گروه بندی ICD- 10 در سال ۹۹:




درصد موارد مرگ ثبت شده مادران بدون موارد کوید ۱۹ به تفکیک گروه بندی ICD- 10 در سال ۹۹:



مقایسه علل فوت در سه سال اخیر با احتساب موارد کوید ۱۹






درصد فراوانی مرگ مادر بر حسب عوامل فردی و باروری در کشور طی سال ۹۹


عوامل فردی و باروری	تعداد مرگ مادر	موالید	درصد فراوانی از کل مرگها
سن مادر	کمتر از ۱۸ سال	۲۰۸۳۰	۲,۲٪
	بین ۱۸-۳۵ سال	۹۱۴۴۶۴	۶۵,۷٪
	بالای ۳۵ سال	۱۹۵۶۰۴	۳۲,۱٪
عوامل فردی و باروری		تعداد مرگ مادر	موالید
نسبت مرگ مادر در صد هزار تولد زنده			
تعداد بارداری	بارداری اول	۱۱۰	۳۵۲۲۷۱
	بارداری دوم	۱۲۰	۳۶۴۵۳۶
	بارداری سوم	۹۲	۲۲۶۷۳۸
	بارداری چهارم	۶۳	۱۰۷۵۷۹
	بارداری پنجم و بیشتر	۷۳	۸۰۷۴۰

تاریخچه بارداری	درصد در سال ۹۸	درصد در سال ۹۹
انجام مراقبت پیش از بارداری	۴۴,۵٪	۳۲,۵٪
حداقل یکبار مراقبت در بارداری	۸۳٪	۸۶,۵٪
تناسب تعداد مراقبت با سن بارداری	۸۵,۵٪	۸۴٪

توزیع سنی موارد مرگ مادر از کل موارد مرگ در سال ۹۹:




نسبت مرگ مادران درصد هزار تولد زنده در گروه سنی مختلف در سال ۹۹:




علل فوت به تفکیک گروه های سنی و تفکیک گروه هفتم (با احتساب کوید- بدون کوید)


علل فوت در گروه سنی کمتر از ۱۸ سال




علل فوت در گروه سنی ۱۸-۳۵ سال




- گروه اول : بارداری منتهی به سقط
- گروه دوم : اختلالات افزایش فشارخون در بارداری، زایمان و پس از زایمان
- گروه سوم : خونریزی مامایی
- گروه چهارم : عفونت مرتبط با بارداری
- گروه پنجم : سایر عوارض مامایی
- گروه ششم : عوارض غیر قابل انتظار از درمان (عوارض بیهوشی)
- گروه هشتم : عوامل ناشناخته یا تعیین نشده
- گروه نهم : عوامل همزمان
- گروه ایکس
- گروه هفتم: کووید
- گروه هفتم: غیر کووید




توزیع فراوانی تعداد بارداری مادران فوت شده از کل موارد مرگ مادر در سال ۹۹




نسبت مرگ مادر درصد هزار تولد زنده به تفکیک رتبه بارداری در سال ۹۹:




علل مرگ در مادران با بارداری اول




علل مرگ در مادران با بارداری دوم و سوم




علل مرگ در مادران با بارداری چهارم و بیشتر



مقایسه علل فوت مادر با احتساب کوید در رتبه های بارداری



مقایسه علل فوت مادر بدون کوید در رتبه های بارداری



عوامل فردی و باروری	تعداد	درصد فراوانی
خواسته بودن بارداری	بلی	۷۶,۴۲٪
	خیر	۲۳٪
	نامشخص	۰,۵۸٪
فاصله دو بارداری آخر	کمتر از ۲ سال	۲۰,۲۵
	مساوی و بیش از ۲ سال	۷۴,۷
	بارداری قبلی سقط یا مول یا EP بوده	۵


گروه بندی علت در بارداری اول	تعداد مرگ مادر در بارداری اول با کوید	درصد با کوید	تعداد مرگ مادر در بارداری اول بدون کوید	درصد بدون کوید
گروه اول : بارداری منتهی به سقط	2	1.8	2	3
گروه دوم : اختلالات افزایش فشارخون در بارداری، زایمان و پس از زایمان	8	7.3	8	12.1
گروه سوم : خونریزی مامایی	8	7.3	8	12.1
گروه چهارم : عفونت مرتبط با بارداری	3	2.8	3	4.5
گروه پنجم : سایر عوارض مامایی	6	5.5	6	9
گروه ششم : عوارض غیر قابل انتظار از درمان (عوارض بیهوشی)	0	0.0	0	0
گروه هفتم : عوارض غیر مامایی	66	60.0	22	33.5
گروه هشتم : عوامل ناشناخته یا تعیین نشده	9	8.3	9	13.8
گروه نهم : عوامل همزمان	4	3.5	4	6
گروه ایکس	4	3.5	4	6

گروه بندی علت فوت در بارداری	تعداد مرگ مادر در بارداری دوم و سوم با کوید	درصد با کوید	تعداد مرگ مادر در بارداری دوم و سوم بدون کوید	درصد بدون کوید
گروه اول : بارداری منتهی به سقط	4	2	4	3,4
گروه دوم : اختلالات افزایش فشارخون در بارداری، زایمان و پس از زایمان	13	6,1	13	11
گروه سوم : خونریزی مامایی	17	8	17	14,5
گروه چهارم : عفونت مرتبط با بارداری	7	3,3	7	6
گروه پنجم : سایر عوارض مامایی	17	8	17	14,5
گروه ششم : عوارض غیر قابل انتظار از درمان (عوارض بیهوشی)	4	1,9	4	3,5
گروه هفتم : عوارض غیر مامایی	124	58,5	30	25
گروه هشتم : عوامل ناشناخته یا تعیین نشده	13	6,1	13	11
گروه نهم : عوامل همزمان	3	1,4	3	2,5
گروه ایکس	10	4,7	10	8,3


عوامل جمعیت شناختی:


بر اساس داده های ثبت شده از مجموع مادران فوت شده ۹۵,۲٪ درصد ایرانی و ۴,۸٪ درصد غیر ایرانی با کارت اقامت بوده اند. از مجموع مادران فوت شده، ۷۳,۵ درصد در مناطق شهری ساکن بودند که از آن تعداد ۷ درصد در حاشیه شهر سکونت داشته اند. مادران فوت شده ساکن در مناطق روستایی ۲۶,۵ درصد بودند که از این تعداد ۳,۸ درصد در روستای سیاری و عشایر ساکن بودند. داده های جمع آوری شده نشان داد که ۳۰ درصد مادران فوت شده بیسواد یا کم سواد (ابتدایی و نهضت) بودند. از مجموع مادران فوت شده، فقط ۲۱ درصد آنها از سطح سواد دانشگاهی برخوردار بودند.

درصد مادران فوت شده از کل موارد مرگ مادر بر حسب محل سکونت در سال ۹۹:



نسبت مرگ مادر (MMR) بر اساس منطقه سکونت در سال ۹۹:





عوامل مربوط به زایمان:


اطلاعات جمع آوری شده بیانگر این مطلب است که حدود ۴ درصد مادران فوت شده در منزل و بین راه و ۹۵ درصد در بیمارستان زایمان کرده اند. این اطلاعات نشان می دهد که ۹۶ درصد از زایمان ها توسط افراد تحصیل کرده، ولی متأسفانه ۴ درصد از زایمان هایی که در منزل و بین راه اتفاق افتاده توسط اطرافیان و یا به صورت خودبخود اتفاق افتاده است.

در ۲۴ درصد از مادران فوت شده در حین زایمان یا پس از زایمان ، بارداری به روش طبیعی خاتمه یافته و در ۷۶ درصد موارد خاتمه بارداری با روش سزارین بوده است.


عوامل مربوط به زایمان	تعداد	درصد فراوانی
محل ختم بارداری	منزل	۴٪
	بین راه	۰/۲۸٪
	درمانگاه/مطب	۰,۵۷٪
	تسهیلات زایمانی	۰/۲۸٪
	بیمارستان	۹۵٪
روش خاتمه بارداری	طبیعی	۲۴٪
	سزارین	۷۶٪
عامل زایمان	تحصیل کرده	۹۶٪
	ماما روستا	۰,۳٪
	اطرافیان / هیچکس	۳,۳٪

سایر موارد	۲	۰,۵ %
------------	---	-------


درصد فراوانی محل ختم بارداری از کل موارد مرگ مادر در سال ۹۹:




درصد مرگ مادر به تفکیک محل ختم بارداری به زایمان های همان گروه:



روش خاتمه بارداری در مادران فوت شده در سال ۹۹:



نسبت مرگ مادر درصد هزار تولد زنده به تفکیک نوع زایمان:



مقایسه درصد فراوانی علل خاتمه بارداری به روش سزارین در مادران فوت شده در کشور:


۱۳۹۹ درصد در سال	علل انجام سزارین
۱۱٪	سزارین الکتیو
۲۷٫۵٪	سزارین تکراری یا سابقه میومکتومی
۵۷٪	سزارین اورژانس مرحله اول زایمان
۳٪	سزارین اورژانس مرحله دوم زایمان
۱٫۵٪	تلاش ناموفق برای زایمان طبیعی (TOLAC)

درصد فراوانی نوع بیهوشی های انجام شده در سزارین موارد فوت شده در سال ۹۹


نوع بیهوشی در سزارین	درصد در سال ۱۳۹۹
بیهوشی عمومی	۴۵٪
بیهوشی اسپینال	۴۸٪
بیهوشی اپیدورال	۰,۵٪
بیهوشی انجام نشده (بدلیل سزارین پس از مرگ)	۶,۵٪

عوامل مربوط به زمان، مکان و علل مرگ:

از مجموع مادران فوت شده ، ۲۰ درصد در طول دوره بارداری فوت کرده اند . مرگ در حین زایمان و پس از زایمان ۸۰ درصد از کل مرگ مادران را به خود اختصاص داده اند.



درصد مادران فوت شده بر حسب مقطع فوت در سه سال ۹۷-۹۹



علل منجر به مرگ مادر در سال ۹۹ بر اساس کدبندی ICD- MM

گروه اول : بارداری منتهی به سقط که حدود ۲,۲ درصد از علل مرگ را شامل شده که به تفکیک کدبندی شامل:

گزینه های سوال علت فوت	کد ICD – MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
بارداری خارج رحمی	O00	۴	۰,۸۷
مول هیداتفرم	O01	۱	۰,۲۲
سایر محصولات غیرطبیعی بارداری	O02	۰	۰
سقط خودبخودی	O03	۰	۰
سقط القایی	O04	۱	۰,۲۲
عوارض به دنبال سقط و بارداری مولار و خارج از رحم	O05	۲	۰,۴۴
سقط نامشخص	O06	۰	۰
اقدام به سقط ناموفق	O07	۲	۰,۴۴

گروه دوم: اختلالات افزایش فشارخون در بارداری، زایمان و پس از زایمان است که ۵/۵٪ علل مرگ مادر

گزینه های سوال علت فوت	کد ICD – MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
پره اکلامپسی اضافه شده (اختلال فشارخون بالا از قبل، به همراه پروتئینوری)	O11	۱	۰,۲۲
ادم بارداری به همراه پروتئینوری، بدون فشارخون بالا	O12	۰	۰
ادم بارداری	O12.0	۰	۰
پروتئینوری بارداری	O12.1	۰	۰
فشار خون بالای بارداری بدون پروتئینوری واضح	O13	۲	۰,۴۴
پره اکلامپسی	O14	۰	۰
پره اکلامپسی خفیف	O14.0	۰	۰
پره اکلامپسی شدید	O14.1	۴	۰,۸۷

سندرم هلمپ	O14.2	۹	۱,۹۷
اکلامپسی	O15	۸	۱,۷۵
افزایش فشار خون نامشخص در مادر	O16	۱	۰,۲۲

گزینه های سوال علت فوت	ICD - MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
خونریزی در سن بارداری کمتر از ۲۰ هفته مانند تهدید به سقط (به جز بارداریهای منتهی به سقط)	O20	۱	۰,۲۲
اختلالات جفت	O43	۰	۰
جفت چسبیده عارضه دار	O43.2	۱۰	۲,۱۸
جفت سر راهی	O44	۰	۰
جداشدگی زودرس جفت یا کندگی جفت	O45	۲	۰,۴۴
خونریزی هنگام بارداری که در جای دیگر طبقه بندی نشده	O46	۱	۰,۲۲
خونریزی حین زایمان طبقه بندی نشده در جای دیگر	O67	۵	۱,۰۹
سایر موارد آسیب مامایی (آسیب با ابزار)	O71	۱	۰,۲۲
پارگی رحم پیش از شروع زایمان	O71.0	۱	۰,۲۲
پارگی رحم طی زایمان	O71.1	۶	۱,۳۱
پارگی سرویکس	O71.3	۰	۰
هماتوم مامایی در لگن	O71.7	۲	۰,۴۴
خونریزی پس از زایمان	O72	۱۵	۳,۲۸
خونریزی مرحله سوم زایمان	O72.0	۲	۰,۴۴
سایر خونریزی های فوری پس از زایمان	O72.1	۳	۰,۶۶
خونریزی پس از زایمان تاخیری و ثانویه	O72.2	۱	۰,۲۲
اختلال انعقادی پس از زایمان	O72.3	۱	۰,۲۲
جمع کل		۵۱	۱۱,۴

گروه چهارم، عفونت مرتبط با بارداری حدود ۵/۰۲ درصد از مرگ مادر را شامل شده به تفکیک کدبندی:

گزینه های سوال علت فوت	ICD - MM کد	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
عفونت دستگاه ادراری تناسلی در بارداری	O23	۲	۰,۶۷
عفونت کیسه آمنیوتیک و غشاها	O41.1	۵	۱,۶۷
سایر عفونتها طی زایمان	O75.3	۰	۰
سپسیس پس از زایمان	O85	۴	۱,۳۴
سایر عفونت ها پس از زایمان	O86	۳	۱
تب با منشأ ناشناخته پس از زایمان	O86.4	۱	۰,۳۳
عفونت پستان مرتبط با زایمان	O91	۰	۰
کزاز مامایی	A34	۰	۰
جمع کل		۱۵	۵,۰۲

گروه پنجم: سایر عوارض مامایی ۷/۴۲٪ موارد مرگ مادر را شامل شده و به تفکیک کدبندی:

گزینه های سوال علت فوت	ICD - MM کد	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
استفراغ زیاد در بارداری همراه با اختلال متابولیک	O21.1	۰	۰
عوارض عروقی در بارداری	O22	۳	۰,۶۶
فلبوترومبوزیس عمیق در بارداری	O22.3	۰	۰
ترمبوز وریدهای مغزی در بارداری	O22.5	۲	۰,۴۴
سایر عوارض وریدی در بارداری	O22.8	۰	۰
عوارض وریدی نامشخص در بارداری	O22.9	۰	۰
دیابت شیرین که در بارداری به وجود آمده	O24.4	۰	۰
اختلالات کبدی در بارداری، زایمان و پس از زایمان	O26.6	۱	۰,۲۲
جفت سر راهی مشخص بدون خونریزی	O44.0	۰	۰

•	•	O71.2	وارونه شدن رحم بعد از زایمان
•	•	O71.5	سایر آسیب های مامایی به ارگان های لگنی
•	•	O71.6	آسیب مامایی به لیگامانها و مفاصل لگنی
•,۲۲	۱	O71.8	سایر موارد مشخص آسیب مامایی
•	•	O73	باقیمانده جفت و غشاها بدون خونریزی
•,۲۲	۱	O75.4	سایر عوارض جراحی و اقدامات مربوط به مامایی
•,۴۴	۲	O75.8	سایر عوارض مشخص زایمان
•,۲۲	۱	O87	عوارض عروقی پس از زایمان
•	•	O87.1	فلبوترومبوزیس عمقی پس از زایمان
•	•	O87.3	ترومبوز ورید مغزی پس از زایمان
•	•	O87.9	عوارض عروقی پس از زایمان ، نامشخص
•,۸۷	۴	O88	آمبولی مامایی
۱,۳۱	۶	O88.1	آمبولی مایع آمنیوتیک
۱,۷۵	۸	O88.2	آمبولی لخته خون
•,۲۲	۱	O90	عوارض پس از زایمان که در جای دیگر طبقه بندی نشده
•	•	O90.0	پارگی زخم سزارین
•	•	O90.1	پارگی زخم پرینه
•	•	O90.2	هماتوم زخم مامایی
•,۲۲	۱	O90.3	کاردیومیوپاتی پس از زایمان
•	•	O90.4	نارسایی حاد کلیه پس از زایمان
•	•	O90.5	تیروئیدیت پس از زایمان
•,۴۴	۲	O90.8	سایر عوارض پس از زایمان طبقه بندی نشده در جای دیگر
۷/۴۲	۳۴		جمع کل

گروه ششم : عوارض غیر قابل انتظار از درمان (عوارض بیهوشی) ۰,۶۷٪ موارد مرگ مادر را شامل شده که به تفکیک کدبندی شامل:

گزینه های سوال علت فوت	ICD - MM کد	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
عوارض بیهوشی طی بارداری	O29	0	0

عوارض بیهوشی طی زایمان	074	۵	۱,۰۹
عوارض بیهوشی پس از زایمان	089	۰	۰
جمع کل		۵	۱,۰۹

گروه هفتم: عوارض غیر مامایی ۳۷٪ موارد مرگ مادر را شامل شده که به تفکیک کدبندی شامل:

گزینه های سوال علت فوت	کد ICD - MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
افزایش فشار خون از قبل موجود	O10	۰	۰
دیابت شیرین (از قبل موجود)	O24	۶	۱,۳۱
بیماری عفونی یا انگلی که باعث ایجاد عارضه در بارداری و پس از زایمان شود	O98	۴	۰,۸۷
هپاتیت ویروسی	O98.4	۱	۰,۲۲
نقص سیستم ایمنی انسانی (HIV)	O98.7	۱	۰,۲۲
آنمی	O99.0	۰	۰
سایر بیماریهای خونی و اندامهای خونساز و سایر اختلالات خاص دستگاه ایمنی	O99.1	۵	۱,۰۹
بیماری های غدد درون ریز، تغذیه ای ، متابولیک	O99.2	۱	۰,۲۲
اختلالات روانی و بیماریهای سیستم عصبی	O99.3	۸	۱,۷۵
بیماریهای دستگاه گردش خون	O99.4	۱۷	۳,۷۱
ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	Q20-Q28	۶	۱,۳۱
بیماریهای دستگاه تنفس	O99.5	۶	۱,۳۱
بیماریهای دستگاه گوارش	O99.6	۸	۱,۷۵
بیماریهای پوست و بافت زیر پوستی	O99.7	۱	۰,۲۲

بدخیمی ها	C00-C48	۹	۱,۹۷
سایر بیماریها و وضعیت های مشخص که باعث عارضه در حاملگی، زایمان و پس از زایمان می شوند	O99.8	۱۱	۲,۴
کوید-۱۹	U07.1	۱۶۱	۳۵,۱۵
مشکوک به کوید-۱۹	U07.1.s	۱۶	۳,۴۹
جمع کل		۲۶۰	۵۶/۷۷

❖ گروه هشتم: عوامل ناشناخته یا تعیین نشده ۵/۶۸٪ موارد مرگ مادر را شامل شده که به تفکیک کدبندی شامل:

گزینه های سوال علت فوت	کد ICD – MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
مرگ به دلیل نامعلوم یا تعیین نشده	O95	۲۶	۵,۶۸

گروه نهم: عوامل همزمان ۲/۴٪ موارد مرگ مادر را شامل شده که به تفکیک کدبندی شامل:

گزینه های سوال علت فوت	کد ICD - MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
علل دیگر که بطور اتفاقی (با زمان بارداری تا پس از زایمان) هم زمان شود	X85 – Y04	۱۱	۲,۴

❖ گروه ایکس: خودکشی های دوران بارداری یا پس از زایمان که ۳/۴۹٪ موارد مرگ مادر را شامل شده و به تفکیک کدبندی شامل:

گزینه های سوال علت فوت	کد ICD - MM	تعداد موارد فوت شده	درصد موارد فوت شده
خودکشی در بارداری یا پس از زایمان	X60 – X84	۱۶	۳,۴۹

تعداد موارد مرگ مادر بر اساس دانشگاه محل سکونت

دانشگاه محل سکونت	تعداد	درصد
مشهد	34	7.4
زاهدان	31	6.8
ایران	26	5.7
اهواز	23	5.0
شیراز	18	3.9
تهران	17	3.7
البرز	17	3.7
اصفهان	16	3.5
شهید بهشتی	16	3.5
ارومیه	15	3.3
ایران شهر	15	3.3
مازندران	15	3.3
بندر عباس	13	2.8
لرستان	13	2.8
آبادان	11	2.4
تبریز	11	2.4
قزوین	10	2.2
قم	10	2.2
کرمانشاه	10	2.2
گلستان	10	2.2
بوشهر	9	2.0
گیلان	9	2.0
همدان	9	2.0
یزد	9	2.0
خراسان شمالی	8	1.7
کرمان	8	1.7
اردبیل	7	1.5
جیرفت	6	1.3
سبزوار	4	0.9

درصد	تعداد	دانشگاه محل سکونت
1.1	5	سمنان
0.9	4	بیرجند
0.7	3	خوی
0.7	3	زنجان
0.7	3	ساوه
0.7	3	سیرجان
0.7	3	شهرکرد
0.7	3	لارستان
0.7	3	نیشابور
0.4	2	اراک
0.4	2	ایلام
0.4	2	بم
0.4	2	تربت جام
0.4	2	تربت حیدریه
0.4	2	زابل
0.4	2	شاهرود
0.4	2	فسا
0.4	2	یاسوج
0.4	2	کشوری
0.2	1	اسفراین
0.2	1	بابل
0.2	1	جهرم
0.2	1	دزفول
0.2	1	رفسنجان
0.2	1	شوشتر
0.2	1	کردستان
0.2	1	مراغه

تعداد موارد مرگ مادر بر اساس دانشگاه محل فوت

درصد	تعداد	دانشگاه محل فوت
1.5	7	آبادان
0.7	3	اراک
1.1	5	اردبیل
3.3	15	ارومیه
0.2	1	اسفراین
3.5	16	اصفهان
5.4	25	اهواز
5.9	27	ایران
2.6	12	ایران شهر
0.7	3	ایلام
0.4	2	بابل
0.2	1	بم
2.8	13	بندر عباس
1.3	6	بوشهر
0.7	3	بیرجند
2.6	12	تبریز
0.2	1	تربت جام
0.2	1	تربت حیدریه
5.4	25	تهران
0.2	1	جهرم
0.9	4	جیرفت
1.5	7	خراسان شمالی
0.7	3	خوی
0.2	1	دزفول
0.4	2	رفسنجان
0.4	2	زابل
7.2	33	زاهدان
0.4	2	زنجان
0.9	4	سبزوار

دانشگاه محل فوت	تعداد	درصد
سمنان	3	0.7
سیرجان	1	0.2
شاهرود	3	0.7
شهرکرد	3	0.7
شهید بهشتی	19	4.1
شوشتر	1	0.2
شیراز	24	5.2
فسا	2	0.4
قزوین	10	2.2
قم	9	2.0
البرز	16	3.5
کردستان	2	0.4
کرمان	12	2.6
کرمانشاه	9	2.0
گلستان	9	2.0
گیلان	9	2.0
لارستان	1	0.2
لرستان	12	2.6
مازندران	13	2.8
مشهد	39	8.5
نیشابور	4	0.9
همدان	8	1.7
یاسوج	2	0.4
یزد	10	2.2

تاخیر در ارسال گزارش فوری دانشگاهها:

دانشگاه محل فوت	تعداد کل مرگ مادر	موارد تاخیر در گزارش فوت	درصد تاخیر در ارسال گزارش فوری
اراک	4	0	0.0
اردبیل	5	1	20.0
ارومیه	15	2	13.3
اسفراین	1	0	0.0
اصفهان	16	1	6.3
البرز	16	3	18.8
اهواز	25	2	8.0
ایران	27	2	7.4
ایرانشهر	12	0	0.0
ایلام	3	1	33.3
آبادان	7	0	0.0
بابل	2	0	0.0
بم	1	0	0.0
بندر عباس	13	0	0.0
بوشهر	6	0	0.0
بیرجند	3	0	0.0
تبریز	12	0	0.0
تربت جام	1	0	0.0
تربت حیدریه	1	0	0.0
تهران	24	1	4.2
چهرم	1	0	0.0
جیرفت	4	0	0.0
خراسان شمالی	7	0	0.0
خوی	3	0	0.0
دزفول	1	0	0.0
رفسنجان	2	0	0.0
زابل	2	0	0.0
زاهدان	33	11	33.3
زنجان	2	0	0.0
سبزوار	4	2	50.0
سمنان	3	0	0.0
سیرجان	1	0	0.0
شاهرود	3	1	33.3

دانشگاه محل فوت	تعداد کل مرگ مادر	موارد تاخیر در گزارش فوت	درصد تاخیر در ارسال گزارش فوری
شهرکرد	3	0	0.0
شهید بهشتی	18	3	16.7
شوشتر	1	0	0.0
شیراز	24	16	66.7
فسا	2	0	0.0
قزوین	10	1	10.0
قم	9	7	77.8
کردستان	2	1	50.0
کرمان	11	1	9.1
کرمانشاه	9	0	0.0
گلستان	9	0	0.0
گیلان	9	0	0.0
لارستان	1	0	0.0
لرستان	12	4	33.3
مازندران	13	2	15.4
مشهد	40	4	10.0
نیشابور	4	0	0.0
همدان	8	0	0.0
یاسوج	2	0	0.0
یزد	10	4	40.0

انجام به موقع پرسشگری دانشگاهها

درصد تشکیل به موقع پرسشگری	انجام به موقع پرسشگری	تعداد	دانشگاه محل سکونت
100.0	11	11	آبادان
100.0	2	2	اراک
71.4	5	7	اردبیل
100.0	15	15	ارومیه
0.0	0	1	اسفراین
100.0	16	16	اصفهان
34.8	8	23	اهواز
80.8	21	26	ایران
86.7	13	15	ایران شهر
100.0	2	2	ایلام
100.0	1	1	بابل
100.0	2	2	بم
100.0	13	13	بندر عباس
100.0	9	9	بوشهر
75.0	3	4	بیرجند
90.9	10	11	تبریز
50.0	1	2	تربت جام
50.0	1	2	تربت حیدریه
47.1	8	17	تهران
100.0	1	1	جهرم
100.0	6	6	جیرفت
62.5	5	8	خراسان شمالی
100.0	3	3	خوی
100.0	1	1	رفسنجان
100.0	2	2	زابل
16.1	5	31	زاهدان
33.3	1	3	زنجان
33.3	1	3	ساوه

دانشگاه محل سکونت	تعداد	انجام به موقع پرسشگری	درصد تشکیل به موقع پرسشگری
سبزوار	4	4	100.0
سمنان	5	3	60.0
سیرجان	3	2	66.7
شاهرود	2	2	100.0
شهرکرد	3	3	100.0
شهید بهشتی	16	13	81.3
شوشتر	1	1	100.0
شیراز	18	13	72.2
فسا	2	2	100.0
قزوین	10	10	100.0
قم	10	9	90.0
البرز	17	12	70.6
کردستان	1	1	100.0
کرمان	8	4	50.0
کرمانشاه	10	10	100.0
گلستان	10	8	80.0
گیلان	9	6	66.7
لارستان	3	3	100.0
لرستان	14	11	78.6
مازندران	15	15	100.0
مراغه	1	0	0.0
مشهد	34	18	52.9
نیشابور	3	3	100.0
همدان	9	8	88.9
یاسوج	2	2	100.0
یزد	9	9	100.0

تاخیر در تشکیل به موقع کمیته در دانشگاهها:


دانشگاه محل فوت	تعداد	تعداد تشکیل به موقع کمیته	درصد تشکیل به موقع کمیته
اراک	4	2	50.0
اردبیل	5	0	0.0
ارومیه	15	3	20.0
اسفراین	1	0	0.0
اصفهان	16	7	43.8
البرز	16	6	37.5
اهواز	23	4	17.4
ایران	25	9	36.0
ایران شهر	12	0	0.0
ایلام	3	2	66.7
آبادان	7	1	14.3
بابل	2	1	50.0
بندر عباس	13	2	15.4
بوشهر	6	0	0.0
بیرجند	3	0	0.0
تبریز	12	10	83.3
تربت جام	1	0	0.0
تربت حیدریه	1	1	100.0
تهران	24	11	45.8
چهرم	1	0	0.0
جیرفت	4	0	0.0
خراسان شمالی	6	2	33.3
خوی	3	3	100.0
رفسنجان	2	0	0.0
زابل	2	2	100.0
زاهدان	30	4	13.3
زنجان	2	1	50.0
دزفول	0	0	0.0

دانشگاه محل فوت	تعداد	تعداد تشکیل به موقع کمیته	درصد تشکیل به موقع کمیته
سبزوار	4	0	0.0
سمنان	3	0	0.0
سیرجان	1	0	0.0
شاهرود	3	1	33.3
شهرکرد	3	2	66.7
شهید بهشتی	18	2	11.1
شوشتر	1	0	0.0
شیراز	24	16	66.7
فسا	1	2	200.0
قزوین	10	0	0.0
قم	9	1	11.1
کردستان	1	0	0.0
کرمان	10	0	0.0
کرمانشاه	7	3	42.9
گلستان	9	5	55.6
گیلان	9	0	0.0
لارستان	1	1	100.0
لرستان	12	3	25.0
مازندران	13	2	15.4
مشهد	39	6	15.4
نیشابور	4	2	50.0
همدان	8	3	37.5
یاسوج	2	0	0.0
یزد	10	2	20.0


مقایسه درصد تشکیل به موقع کمیته ها در سال ۹۸-۹۹



تعداد کل	درصد	تعداد	تشکیل به موقع کمیته	سال فوت
459	26	119	بله	1399
300	20	59	بله	1398

درصد تشکیل به موقع کمیته



وجود عامل قابل اجتناب





اطلاعات سهم دانشگاه از موالید و مرگ مادر از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

لازم به ذکر است در جدول زیر دانشکده هایی که در سالهای اخیر از دانشگاه مبداء خود جدا شده اند از زمان تفکیک موالید و مرگ آنها ثبت شده است .

نسبت مرگ به موالید	جمع مرگ	مرگ ۹۵	مرگ ۹۶	مرگ ۹۷	مرگ ۹۸	مرگ ۹۹	جمع موالید	موالید ۹۵	موالید ۹۶	موالید ۹۷	موالید ۹۸	موالید ۹۹	دانشگاه/ دانشکده
44.36	۳۰	۴	۷	۴	۹	۱۱	۷۸۸۹۶	۲۲۳۷۶	۱۰۷۱۴	۱۴۹۰۰	۱۳۳۹۰	۱۲۰۱۱	آبادان
17.10	۴۷	۱۴	۹	۵	۸	۱۱	۲۷۴۷۷۹	۶۵۰۲۳	۶۲۸۶۷	۵۴۷۹۳	۴۷۸۰۰	۴۴۲۹۱	آذربایجان شرقی
16.64	۱			۰	۱	۰	۶۰۱۱			۲۳۶۸	۱۸۸۲	۱۸۶۱	سراب
28.84	۶	۱	۱	۰	۳	۱	۲۰۸۰۰	۴۷۰۸	۴۵۰۱	۴۳۲۶	۳۶۵۰	۳۰۶۰	مراغه
21.48	۶۱	۹	۱۱	۸	۱۸	۱۵	۲۸۳۹۳۹	۶۷۴۳۹	۶۵۳۷۵	۵۴۷۰۴	۴۹۱۹۹	۴۷۳۳۲	آذربایجان غربی
34.00	۶			۲	۱	۳	۱۷۶۴۹			۶۱۶۱	۵۸۲۲	۵۶۶۶	خوی
18.85	۲۰	۳	۳	۳	۴	۷	۱۰۶۱۰۱	۲۴۷۴۷	۲۳۶۷۹	۲۲۰۴۲	۱۹۱۶۳	۱۶۴۷۰	اردبیل
	۰					۰	۷۷۸					۷۷۸	خلخال
16.52	۵۳	۱۲	۹	۷	۹	۱۶	۳۲۰۸۷۸	۷۵۸۸۵	۷۲۹۰۶	۶۶۱۱۲	۵۵۱۰۱	۵۰۸۷۴	اصفهان
17.62	۶	۰	۱	۱	۴	۰	۳۴۰۴۸	۷۹۲۵	۷۶۵۲	۷۰۳۱	۵۹۲۰	۵۵۲۰	کاشان
23.07	۱۱	۰	۲	۲	۵	۲	۴۷۶۷۴	۱۰۶۳۱	۱۰۶۶۲	۹۹۹۸	۸۵۶۶	۷۸۱۷	ایلام
30.30	۲۹	۵	۶	۵	۴	۹	۹۵۷۲۱	۲۲۸۳۲	۲۱۷۶۱	۱۹۶۹۴	۱۶۳۵۵	۱۵۰۷۹	بوشهر
31.56	۱۰	۱	۱	۲	۴	۲	۳۱۶۸۱	۷۰۷۷	۶۷۹۷	۶۴۵۲	۵۷۹۴	۵۵۶۱	بم
21.33	۷	۱	۱	۲	۱	۲	۳۲۸۲۴	۷۹۵۴	۷۵۸۰	۶۷۴۰	۵۰۱۸	۵۵۳۲	تربت حیدریه
31.72	۱۰	۳	۰	۰	۵	۲	۳۱۵۳۰	۶۷۳۲	۶۷۴۶	۶۴۱۹	۵۹۲۰	۵۷۱۳	تربت جام
20.28	۱۷۹	۳۷	۲۳	۲۳	۲۷	۵۹	۸۸۲۴۳۴	۲۰۳۹۳۵	۱۹۹۷۰۴	۱۸۰۲۸۸	۱۵۶۵۵۸	۱۴۲۹۵۹	تهران(شهید بهشتی،تهران)
20.69	۳۰	۲	۴	۵	۷	۱۷	۱۶۹۱۲۵	۴۰۲۱۶	۴۰۰۳۶	۳۴۹۵۴	۲۹۱۸۱	۲۴۷۳۸	کرج

نسبت مرگ به موالید	جمع مرگ	مرگ ۹۵	مرگ ۹۶	مرگ ۹۷	مرگ ۹۸	مرگ ۹۹	موالید جمع	موالید ۹۵	موالید ۹۶	موالید ۹۷	موالید ۹۸	موالید ۹۹	دانشگاه/ دانشگاه
9.79	۹	۰	۱	۴	۱	۳	۹۱۹۵۰	۲۱۳۸۸	۲۰۳۴۱	۱۸۸۱۸	۱۶۲۹۳	۱۵۱۱۰	چهارمحال بختیاری
19.22	۱۶	۳	۲	۳	۴	۴	۸۳۲۵۵	۱۸۳۳۲	۱۷۸۸۵	۱۶۷۹۹	۱۵۴۶۱	۱۴۷۷۸	خراسان جنوبی
24.35	۱۱۸	۲۷	۲۱	۱۵	۲۱	۳۴	۴۸۴۵۱۵	۱۱۰۴۸۴	۱۰۷۶۷۵	۹۸۷۷۹	۸۷۰۳۸	۸۰۵۳۹	خراسان رضوی
16.01	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۱۲۴۹۶	۲۷۷۳	۲۷۶۶	۲۵۷۷	۲۳۴۰	۲۰۴۰	گناباد
26.89	۱۱	۲	۲	۰	۲	۵	۴۰۹۱۱	۹۵۶۹	۹۰۹۹	۸۳۰۳	۷۲۸۱	۶۶۵۹	سیزوار
38.51	۲۸	۲	۴	۷	۷	۸	۷۲۷۰۲	۱۶۷۵۲	۱۵۹۸۵	۱۴۳۶۲	۱۳۲۴۰	۱۲۳۶۳	خراسان شمالی
27.85	۳	۱	۱	۰	۰	۱	۱۰۷۷۲	۲۴۴۶	۲۴۸۰	۲۱۴۸	۱۹۱۴	۱۷۸۴	اسفراین
23.71	۱۱	۲	۳	۰	۳	۳	۴۶۴۰۳	۱۰۹۸۸	۱۰۷۵۰	۹۵۷۲	۸۴۱۰	۶۶۸۳	نیشابور
26.75	۹۲	۲۰	۱۵	۱۹	۱۵	۲۳	۳۴۲۸۹۱	۶۷۱۵۸	۷۵۷۷۷	۷۲۷۱۹	۶۴۰۱۱	۶۴۲۲۶	خوزستان
18.00	۱۲	۱	۳	۶	۲	۰	۶۶۶۴۹	۱۵۲۰۲	۱۵۹۱۰	۱۵۵۲۱	۱۳۳۷۳	۶۶۴۳	دزفول
17.95	۳	۲	۰	۱	۰	۰	۱۶۷۱۶	۳۸۵۵	۳۷۵۴	۳۵۲۰	۲۹۵۰	۲۶۳۷	بهبهان
28.90	۶	۰	۲	۱	۲	۱	۲۰۷۵۹	۵۳۶۲	۴۴۷۶	۴۱۴۴	۳۴۰۸	۳۳۶۹	شوشتر
12.13	۱۱	۲	۱	۲	۳	۳	۹۰۶۹۴	۲۰۵۳۴	۲۰۱۸۵	۱۸۴۹۷	۱۶۳۳۲	۱۵۱۴۶	زنجان
52.23	۱۴	۳	۴	۰	۲	۵	۲۶۸۰۵	۶۵۴۵	۶۳۰۴	۵۲۰۱	۴۵۶۸	۴۱۸۷	سمنان
21.43	۴	۱	۰	۰	۱	۲	۱۸۶۶۹	۳۹۶۶	۳۹۸۹	۴۱۲۹	۳۴۵۹	۳۱۲۶	شاهرود
40.75	۱۰۲	۱۹	۳۰	۱۰	۱۳	۳۰	۲۵۰۳۲۳	۵۹۵۲۳	۶۰۷۴۸	۴۳۱۴۶	۴۵۸۴۴	۴۱۰۶۲	سیستان و بلوچستان
18.48	۹	۲	۱	۳	۱	۲	۴۸۶۹۶	۱۰۶۷۶	۱۰۴۱۶	۱۰۱۹۶	۸۹۷۴	۸۴۳۴	زابل

نسبت مرگ به موالید	جمع مرگ	مرگ ۹۵	مرگ ۹۶	مرگ ۹۷	مرگ ۹۸	مرگ ۹۹	موالید جمع	موالید ۹۵	موالید ۹۶	موالید ۹۷	موالید ۹۸	موالید ۹۹	دانشگاه / دانشگاه
31.59	۵۲	۸	۸	۱۲	۹	۱۵	۱۶۴۶۳۶	۲۶۷۱۹	۲۵۸۷۴	۳۹۳۱۰	۳۲۵۱۵	۴۰۲۰۸	ایران شهر
17.00	۵۳	۵	۱۰	۱۴	۶	۱۸	۳۱۱۷۶۴	۷۳۰۱۸	۶۹۴۰۸	۶۳۰۴۷	۵۵۲۶۴	۵۱۰۲۷	فارس
14.93	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۲۰۰۹۳	۵۰۲۷	۴۸۹۱	۴۱۵۵	۳۲۲۵	۲۷۹۵	جهرم
17.69	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱۶۹۶۲	۴۱۲۸	۳۹۷۵	۳۴۳۴	۲۸۶۸	۲۵۵۷	فسا
26.79	۵	۰	۱	۱	۰	۳	۱۸۶۶۷	۴۰۲۵	۴۷۶۶	۴۲۲۳	۲۹۴۳	۲۷۱۰	لارستان
0.00	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴۰	۱۱۶۱	۱۱۷۹	۱۰۶۱	۱۰۵۲	۷۸۷	گراش
19.65	۱۸	۳	۳	۱	۱	۱۰	۹۱۵۹۵	۲۱۴۷۹	۲۰۷۲۷	۱۸۵۹۲	۱۶۰۲۸	۱۴۷۶۹	قزوین
29.22	۳۳	۷	۷	۳	۶	۱۰	۱۱۲۹۵۲	۲۶۴۴۵	۲۵۱۷۸	۲۳۲۲۶	۲۰۰۱۸	۱۸۰۸۵	قم
9.70	۱۳	۲	۳	۳	۴	۱	۱۳۴۰۲۷	۳۰۰۷۵	۲۹۸۳۸	۲۷۵۰۱	۲۳۹۶۲	۲۲۶۵۱	کردستان
27.80	۳۶	۹	۷	۶	۶	۸	۱۲۹۵۰۵	۳۴۳۹۴	۳۲۷۳۸	۲۳۴۴۶	۲۰۱۴۶	۱۸۷۸۱	کرمان
18.04	۵	۱	۲	۰	۱	۱	۲۷۷۱۱	۶۷۴۱	۶۳۹۰	۵۵۱۳	۴۹۴۵	۴۱۲۲	رفسنجان
43.92	۳۱	۸	۶	۶	۵	۶	۷۰۵۷۷	۱۵۱۰۴	۱۳۸۰۶	۱۵۰۸۹	۱۳۴۸۹	۱۳۰۸۹	جیرفت
48.51	۷			۳	۱	۳	۱۴۴۳۰			۵۲۳۰	۴۸۱۶	۴۳۸۴	سیرجان
22.07	۳۳	۵	۹	۴	۵	۱۰	۱۴۹۴۹۸	۳۴۴۶۱	۳۳۲۷۶	۲۹۹۵۴	۲۶۵۶۶	۲۵۲۴۱	کرمانشاه
21.79	۱۵	۲	۷	۰	۴	۲	۶۸۸۲۹	۱۶۳۱۲	۱۵۱۱۶	۱۴۲۰۹	۱۲۰۳۹	۱۱۱۵۳	کهکیلویه و بویراحمد
22.33	۴۱	۴	۱۰	۸	۹	۱۰	۱۸۳۵۷۶	۴۱۴۹۳	۴۱۰۱۷	۳۷۲۴۵	۳۲۹۴۱	۳۰۸۸۰	گلستان
21.57	۲۸	۱	۲	۷	۹	۹	۱۲۹۷۹۸	۳۰۰۶۱	۲۹۱۱۷	۲۶۶۷۳	۲۲۸۱۵	۲۱۱۲۲	گیلان

نسبت مرگ به موالید	جمع مرگ	مرگ ۹۵	مرگ ۹۶	مرگ ۹۷	مرگ ۹۸	مرگ ۹۹	موالید جمع	موالید ۹۵	موالید ۹۶	موالید ۹۷	موالید ۹۸	موالید ۹۹	دانشگاه/ دانشکده
18.92	۳۰	۷	۴	۳	۲	۱۴	۱۵۸۵۸۹	۳۶۵۸۵	۳۴۷۴۹	۳۲۳۷۲	۲۸۳۰۵	۲۶۵۷۸	لرستان
25.67	۴۱	۲	۸	۹	۷	۱۵	۱۵۹۷۱۸	۳۷۳۷۰	۳۶۲۲۰	۳۳۰۱۰	۲۸۱۰۴	۲۵۰۱۴	مازندران
11.97	۴	۰	۱	۰	۲	۱	۳۳۴۲۹	۷۹۲۲	۷۷۱۲	۶۸۳۶	۵۷۹۸	۵۱۶۱	بابل
16.39	۱۱	۲	۳	۲	۲	۲	۶۷۱۱۳	۱۷۶۴۰	۱۶۶۰۸	۱۲۵۴۳	۱۰۵۱۵	۹۸۰۷	مرکزی
34.84	۷	۱	۱	۰	۲	۳	۳۰۰۹۱	۴۳۰۶	۴۱۸۶	۴۵۰۱	۳۶۶۴	۳۴۳۴	ساوه
27.03	۱			۱	۰	۰	۳۷۰۰			۱۳۹۸	۱۱۶۲	۱۱۴۰	خمین
38.19	۷۲	۱۸	۱۲	۱۱	۱۸	۱۳	۱۸۸۵۵۰	۴۲۹۰۰	۴۰۸۴۸	۳۷۹۳۴	۳۴۷۱۴	۳۲۱۵۴	هرمزگان
16.44	۱۸	۱	۳	۱	۴	۹	۱۰۹۴۶۲	۲۵۴۷۹	۲۴۶۲۶	۲۲۲۲۳	۱۹۱۷۶	۱۷۹۴۸	یزد
24.09	۳۳	۵	۷	۳	۹	۹	۱۳۷۰۰۵	۳۳۱۹۵	۳۱۱۹۳	۲۶۹۴۲	۲۳۵۱۹	۲۲۱۵۶	همدان
0.00	۰			۰	۰	۰	۴۱۴۲			۱۵۲۴	۱۳۱۸	۱۳۰۰	اسدآباد
	۱۳	۴	۴	۲	۱	۲	۰						کشوری
23.50	۱۵۷۳	۳۷۶	۲۹۷	۲۴۲	۳۰۰	۴۵۸	۶۶۹۳۷۲۸	۱۵۲۸۰۵۳	۱۴۸۷۹۰۸	۱۳۶۶۵۱۹	۱۱۹۶۱۳۲	۱۱۱۴۱۱۶	کل کشور